

Indomet

Virkning: "Gigtmedicin" (NSAID) hvor vi udnytter side-effekten, som nedsætter naturinudskillelsen pga. mindre saltudskillelse.

Mulige bivirkninger:

Irriteret mavesæk, kvalme, mavesmerter, forstoppelse.

Dosering:

Tabletter á 25 mg, 1 – 2 tabletter før sengetid efter aftale med lægen.

Dosis må ikke overskrides.

Kontraindikation:


Irriteret mavesæk. Mavesår.

Når barnet er blevet pålideligt nattetørt, skal der pauseres med Imipramin hhv Indomet mindst hvert halve år for at vurdere, om barnet fortsat har behov for medicinsk behandling.

Så længe barnet får Imipramin eller Indomet, skal det følges i klinikken.



Klinik for børn & unge



Medicin til børn med ufrivillig natlig vandladning



Minirin indeholder det aktive lægemiddel desmopressin og sælges under forskellige navne: Minirin, Desmopressin, Minirin Melt og Desmomelt.

Virkning:
Nedsætter kroppens urinproduktion. Det antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i hypofysen, regulerer kroppens væskebalance. Nogle børn danner ikke nok hormon om natten og producerer derfor store mængder tis om natten, når de sover. Desmopressin er et kunstigt stof med samme virkning som ADH.

Mulige bivirkninger:
Den væsentligste bivirkning er tilbageholdelse af væske i kroppen og i værste fald væskeophobning i hjernen. Derfor er det vigtigt, at der ikke indtages væske efter indtagelse af Minirin.
Hovedpine, mavesmerter, forstoppelse, diarré, kvalme, træthed.

Dosering:
I klinikken er aftalt, hvilken dosis, der skal gives: 120 ug eller 240 ug.
Den frysetørrede tablet lægges under barnets tunge mindst én time før sengetid. Barnet skal helst undgå at synke det første minut efter tablettens placering under tungen.

Kontraindikation:
Hjerte- eller nyresygdom
”Sygelig tørst”
Samtidig anvendelse af visse midler mod depression, epilepsi eller ”gigtmedicin” (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen.
Midler mod diarré bør ikke gives samtidig med Minirin.



Når barnet er pålidelig nattetørt, skal der pauseres med Minirin ca. hver 3. måned for at vurdere, om barnet fortsat har behov for medicinsk behandling. Ved tilbagefald ifm. medicinpausen, kan behandlingen genoptages.

I tilfælde, hvor Minirin ikke har den ønskede virkning, vil vi i nogle tilfælde tilbyde barnet at afprøve anden medicin.

Imipramin

Virkning: Velkendt antidepressiv medicin, hvor vi udnytter en bivirkning, som nedsætter naturinudskillelsen og øger blærens størrelsen.

Mulige bivirkninger:
Forstoppelse, mundtørhed.

Forgiftning:

Langsom puls og i værste fald hjertestop. Derfor meget vigtigt med en sikker opbevaring, som er utilgængelig for børn.

Dosering:
Tabletter á 25 mg, 1 – 2 tabletter efter aftale med lægen. Dosis må ikke overskrides.

Kontraindikation:
Hjertesygdom. Derfor får alle børn kontrolleret EKG, før behandlingen påbegyndes.

